

Traduction inofficielle de la notice allemande

MODE D'EMPLOI – À lire attentivement!

Soventol® Stylo



Composition

Alcool dénat., menthol, dexpanthénol, aloé barbadensis, polidocanol, gomme xanthane, eau purifiée, acide citrique, hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté.

Forme pharmaceutique et contenu

1 boîte contient 4 ml de gel.

Fabricant

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn,

Téléphone: 02371/937-0, fax: 02371/937-329, E-mail: info@medice.de, www.medice.de

Destination

En raison de son effet rafraîchissant, Soventol® Stylo roll-on est utilisé pour le soulagement local de démangeaisons et de brûlures, p. ex. en cas de piqûres d'insectes et de coups de soleil.

Contre-indications

Quand Soventol® Stylo roll-on ne doit-il pas être appliqué?

Soventol® Stylo roll-on ne doit pas être appliqué:

- en cas d'hypersensibilité à l'un des composants
- sur une peau lésée ou sur des plaies

Précautions d'emploi et mises en garde

Quelles sont les précautions d'emploi à observer?

Chez les enfants, Soventol® Stylo roll-on ne doit pas être appliqué sur une surface étendue.

Chez les enfants de moins de 2 ans, Soventol® Stylo roll-on ne doit pas être appliqué sur le visage ou le cou.

Ne pas appliquer au niveau de l'œil ou à proximité immédiate de l'œil.

L'ingestion accidentelle du bouchon peut entraîner des difficultés respiratoires. Dans ce cas, veuillez immédiatement consulter un médecin.

Interactions

Quels sont les autres dispositifs médicaux ou médicaments qui influencent l'effet de Soventol[®] Stylo roll-on ou dont l'effet est influencé par Soventol[®] Stylo roll-on?

Veillez noter que ces informations peuvent également s'appliquer à des médicaments ou à d'autres dispositifs médicaux ayant été récemment utilisés.

La libération d'autres substances actives à partir d'autres préparations cutanées et leur absorption cutanée peuvent être renforcées par Soventol[®] Stylo roll-on. C'est pourquoi Soventol[®] Stylo roll-on ne devrait pas être appliqué au même endroit en même temps que d'autres préparations cutanées.

Posologie, mode et durée d'administration

Comment et à quelle fréquence faut-il utiliser Soventol[®] Stylo roll-on?

Soventol[®] Stylo roll-on est appliqué de manière ponctuelle sur les zones de peau atteintes. Grâce à son effet rafraîchissant, il soulage rapidement les démangeaisons. Dès que l'effet diminue, l'application peut être répétée plusieurs fois par jour de la même manière. Parallèlement, la peau agressée et qui démange est durablement soignée et apaisée grâce à la formule spéciale aux composants de qualité, tels que l'aloé véra et le panthénol.

Effets secondaires

Quels effets indésirables Soventol[®] Stylo roll-on peut-il provoquer?

Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez vous adresser à votre pharmacien ou au fabricant. Ceci s'applique également aux effets indésirables non mentionnés dans cette notice.

Soventol[®] Stylo roll-on est généralement bien toléré. Dans de rares cas, des réactions cutanées peuvent survenir en cas d'hypersensibilité aux composants.

Remarques et données relatives à la stabilité et à la conservation du dispositif médical

Soventol[®] Stylo roll-on doit être conservé hors de la portée des enfants!

Veillez à bien refermer le stylo après l'application pour éviter qu'il ne se dessèche.

La date de péremption est imprimée sur le stylo et sur l'emballage.

Soventol[®] Stylo roll-on ne doit plus être utilisé après la date de péremption!

Soventol[®] Stylo roll-on se conserve 6 mois après ouverture.

Mise à jour de l'information

mai 2015

Signification des symboles figurant sur l'emballage



EXP:



Numéro de lot



Respecter le mode d'emploi



Dispositif médical

Entreprise pharmaceutique et fabricant

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

Téléphone: +49 (0) 2371 937-0

Fax: +49 (0) 2371 937-329

E-mail: info@medice.de

www.medice.de